

- Prairie et biodiversité -

Zoom sur les oiseaux

Dans les prairies se cachent des oiseaux dépendants de ces milieux ouverts.

La prairie est un lieu privilégié pour l'alimentation et la reproduction de certains oiseaux. Il y aurait ainsi 37 espèces d'oiseaux en France (et 26 en Alsace) que l'on trouve uniquement dans les milieux agricoles ouverts.

Entre 1980 et 2010, les populations d'oiseaux des milieux agricoles ont connu un déclin de 52 % en Europe. En Alsace, 62 % des espèces d'oiseaux des milieux agricoles sont menacées ou quasi-menacées (contre 43 % sur la France entière).

Les oiseaux sont de très bons bio-indicateurs. Leur présence et leur fidélité aux espaces ouverts de la Vallée de la Bruche, notamment pour les oiseaux migrateurs (la pie-grièche écorcheur, le tarier pâtre et le tarier des prés) est le reflet de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et d'un écosystème préservé (qualité du paysage, de l'eau...) et riche en biodiversité (plantes, insectes, araignées, oiseaux...).



Les usages responsables de ce déclin :

- Date de fauche trop précoce (pendant la nidification)
- Utilisation excessive de pesticides
- Perte de diversité des paysages agricoles : disparition des haies, buissons et arbres isolés
- Augmentation des superficies en cultures annuelles et en monoculture
- Régression des prairies naturelles
- Disparition des milieux humides avec le drainage
- Irrigation
- Diminution des surfaces agricoles au profit de l'urbanisation

L'influence des bonnes pratiques :

- **La diversité floristique** a un effet positif sur la diversité en insectes, en araignées et en oiseaux.
- **La fauche tardive** a un effet positif sur la diversité floristique et sur le succès de reproduction de certains oiseaux des milieux agricoles.
- **La diversité floristique** a un effet positif sur la qualité gustative des fromages et de la viande.

Quatre oiseaux indicateurs de milieux agricoles en très bon état



> Le tarier des prés

Le tarier des prés est un oiseau des milieux ouverts gérés de manière non intensive, riches en insectes et ponctués de perchoirs divers : ombellifères, chardons, piquets de clôture, petits arbres et buissons.

Classé «en danger» sur la liste rouge d'Alsace, il connaît un déclin de 72% en France depuis 1989 ! Cet oiseau qui niche à même le sol dans les prairies est victime des fauches précoces (avant le 1^{er} juillet) qui détruisent sa nichée et les insectes qui lui servent de garde-manger.

> Le tarier pâtre

Le tarier pâtre est un oiseau caractéristique des landes, des friches, des bocages et des talus linéaires de bords de routes, de voies ferrées et de canaux.

Il n'est pas sur liste rouge mais en régression là où les talus (lieux privilégiés de nidification) sont trop bien entretenus et fauchés régulièrement, ce qui entraîne la destruction de son alimentation quotidienne : les insectes.

> La pie-grièche écorcheur

La pie-grièche écorcheur est un oiseau des milieux ouverts gérés de manière non intensive, riches en insectes et ponctués de petits arbres et buissons épineux pour y installer le nid (par ordre de préférence, il y a l'aubépine, le prunellier, l'églantier et la ronce).

La pie-grièche écorcheur est classée «vulnérable» sur la liste rouge d'Alsace car elle est victime de la raréfaction des buissons épineux et de la diminution des populations d'insectes inféodés dont elle se nourrit.

> Le bruant jaune

Le Bruant Jaune est typique des milieux bocagers. Il niche dans les broussailles. Il n'est pas sur liste rouge.

Comme la pie-grièche écorcheur, là où les petits arbres, arbustes et buissons (lieux privilégiés de nidification et d'alimentation en insectes) sont trop souvent coupés et totalement absents du paysage, cela concourt inexorablement à sa régression voir disparition !

Il se repère facilement grâce à son chant typique.

